



Płońsk, dnia 03 stycznia 2020 r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W PŁOŃSKU

**Lech Chybała**

### Wg rozdzielnika

PIW.ZOZ.ZAK.5201.AI.1.2020

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach 4 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego oraz woj. wielkopolskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku zwraca się prośbą o pomoc w rozdysponowaniu informacji wśród rolników o istniejącym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie pow. płońskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku przypomina również o obowiązku przestrzegania przez posiadaczy drobiu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 poz. 722).

„§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

**1) zakazuje się:**

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

**2) nakazuje się:**

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
- c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk  
tel.: (23) 662-22-45, fax: (23) 662-22-45, e-mail: sekretariat@piw-plonsk.pl

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. (...)

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.”

Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, **hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji** (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

- zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
- spadek dziennej produkcji jaj;
- spadek przyjęcia paszy lub wody;
- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Płońsku  
*Chybała*  
lek. wet. *lech Chybała*

Rozdzielnik :

1. Starosta Powiatu Płońskiego
2. Burmistrz Miasta Płońsk
3. Burmistrz Miasta Raciąż



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku, ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk  
tel.: (23) 662-22-45, fax: (23) 662-22-45, e-mail: sekretariat@piw-plonsk.pl



4. Wójt Gminy Baboszewo
5. Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
6. Wójt Gminy Dzierżąznia
7. Wójt Gminy Joniec
8. Wójt gminy Naruszewo
9. Wójt Gminy Nowe Miasto
10. Wójt Gminy Płońsk
11. Wójt Gminy Raciąż
12. Wójt Gminy Sochocin
13. Wójt Gminy Załuski
14. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku
15. ARiMR Biuro Powiatowe w Płońsku
16. PZL Zarząd Okręgowy, w Ciechanowie





# UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU  
OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE  
ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)





# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



**W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

## **Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu**

### Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborna ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności